



Ředění a načasování vypití vyprazdňovacího roztoku FORTTRANS, VISTAPREP dle termínu vyšetření.

Každý sáček přípravku Fortrans/Vistaprep je potřeba rozpustit v 1 litru vychlazené čiré tekutiny (např. voda, voda s citrónem nebo vitamínem C). Během přípravy je možné pít kromě vlastního vyprazdňovacího roztoku další čiré tekutiny (např. minerálka, voda, čaj), nevhodné je pít mléko, džus s dužinou, kávu či alkohol! Doporučený režim dodržte, i když Vám večer z konečníku odchází již čirá tekutina, ranní část přípravy by neměla být vynechána a roztok je vhodné dopít!

1) koloskopie v 8:00: 3 l roztoku vypít den před vyšetřením v 16:00 – 19:00, 1 l roztoku v den vyšetření ve 3:00 – 4:00

2) koloskopie v 9:00: 3 l roztoku vypít den před vyšetřením v 16:00 – 19:00, 1 l roztoku v den vyšetření ve 4:00 – 5:00

3) koloskopie v 10:00: 3 l roztoku vypít den před vyšetřením v 17:00 – 20:00, 1 l roztoku v den vyšetření v 5:00 – 6:00

4) koloskopie v 11:00: 3 l roztoku vypít den před vyšetřením v 17:00 – 20:00, 1 l roztoku v den vyšetření v 6:00 – 7:00

5) koloskopie v odpoledních hodinách od 13:00: 2 l roztoku vypít den před vyšetřením v 17:00 – 19:00, 2 l roztoku v den vyšetření v 6:00 – 8:00



Ředění a načasování vypití vyprazdňovacího roztoku MOVIPREP dle termínu vyšetření.

Jedno balení přípravku obsahuje 2 průhledné sáčky, každý obsahuje jeden pár sáčků (sáček „A“ a sáček „B“) pro přípravu 2 litrů roztoku. Každý pár sáčků („A“ a „B“) se musí rozpustit společně v jednom litru vody (celkem se tedy umíchá 2× 1000 ml solí). Během přípravy je **NUTNÉ** pít kromě vlastního vyprazdňovacího roztoku **NEJMÉNĚ 1 LITR** další čiré tekutiny (např. minerálka, voda, čaj), nevhodné je pít mléko, džus s dužinou, kávu či alkohol! Doporučený režim dodržte, i když Vám večer z konečníku odchází již čirá tekutina, ranní část přípravy by neměla být vynechána a roztok je vhodné dopít!

1) koloskopie v 8:00: 1. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením v 19:00 – 21:00, 2. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření ve 3:00 – 5:00

2) koloskopie v 9:00: 1. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením v 19:00 – 21:00, 2. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření ve 4:00 – 6:00

3) koloskopie v 10:00: 1. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením ve 20:00 – 22:00, 2. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření v 5:00 – 7:00

4) koloskopie v 11:00: 1. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením ve 20:00 – 22:00, 2. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření v 6:00 – 8:00

5) koloskopie v odpoledních hodinách od 13:00: 1. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením ve 21:00 – 23:00, 2. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření v 8:00 – 10:00



Ředění a načasování vypití vyprazdňovacího roztoku CLENSIA dle termínu vyšetření.

Jeden cyklus vyprázdnění střev u dospělých sestává ze čtyř sáčků A a čtyř sáčků B rozpuštěných ve dvou litrech vody a užitých perorálně. Večer před klinickým vyšetřením se má připravit roztok přípravku Clensia za použití obsahu dvou sáčků A a dvou sáčků B, který se rozpustí v 1 litru vody. Ráno v den klinického vyšetření se obsah zbývajících dvou sáčků A a dvou sáčků B má opět rozpustit v 1 litru vody a má se vypít stejným způsobem. Během přípravy je NUTNÉ pít kromě vlastního vyprazdňovacího roztoku NEJMÉNĚ 1 LITR další čiré tekutiny (např. minerálka, voda, čaj), nevhodné je pít mléko, džus s dužinou, kávu či alkohol! Doporučený režim dodržte, i když Vám večer z konečníku odchází již čirá tekutina, ranní část přípravy by neměla být vynechána a roztok je vhodné dopít!

1) koloskopie v 8:00: 1. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením v 19:00 – 21:00, 2. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření ve 3:00 – 5:00

2) koloskopie v 9:00: 1. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením v 19:00 – 21:00, 2. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření ve 4:00 – 6:00

3) koloskopie v 10:00: 1. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením ve 20:00 – 22:00, 2. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření v 5:00 – 7:00

4) koloskopie v 11:00: 1. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením ve 20:00 – 22:00, 2. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření v 6:00 – 8:00

5) koloskopie v odpoledních hodinách od 13:00: 1. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením ve 21:00 – 23:00, 2. dávku (1 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření v 8:00 – 10:00



Ředění a načasování vypití vyprazdňovacího roztoku EZICLEN dle termínu vyšetření.

Balení přípravku Eziclen obsahuje 2 lahvičky s tekutinou. Před užitím musí být obsah každé lahve smísen s vodou za použití přiložené odměrky. Odměrka by měla být doplněna po rysku, tak aby byl celkový objem přibližně 0,5 litru. Během přípravy je **NUTNÉ** pít kromě vlastního vyprazdňovacího roztoku **NEJMÉNĚ 1 LITR** další čiré tekutiny (např. minerálka, voda, čaj), nevhodné je pít mléko, džus s dužinou, kávu či alkohol! Doporučený režim dodržte, i když Vám večer z konečníku odchází již čirá tekutina, ranní část přípravy by neměla být vynechána a roztok je vhodné dopít!

1) koloskopie v 8:00: 1. dávku (0,5 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením v 19:00 – 21:00, 2. dávku (0,5 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření ve 3:00 – 5:00

2) koloskopie v 9:00: 1. dávku (0,5 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením v 19:00 – 21:00, 2. dávku (0,5 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření ve 4:00 – 6:00

3) koloskopie v 10:00: 1. dávku (0,5 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením ve 20:00 – 22:00, 2. dávku (0,5 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření v 5:00 – 7:00

4) koloskopie v 11:00: 1. dávku (0,5 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením ve 20:00 – 22:00, 2. dávku (0,5 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření v 6:00 – 8:00

5) koloskopie v odpoledních hodinách od 13:00: 1. dávku (0,5 l roztoku, poté 1 l vody) vypít den před vyšetřením ve 21:00 – 23:00, 2. dávku (0,5 l roztoku, poté 1 l vody) vypít v den vyšetření v 8:00 – 10:00



Ředění a načasování vypití vyprazdňovacího roztoku PICOPREP dle termínu vyšetření.

Balení přípravku Picoprep obsahuje 2 sáčky s práškem. Obsah jednoho sáčku rozpustíte ve sklenici vody (cca 150 ml). Míchejte 2 až 3 minuty až do vzniku bílé, zakalené tekutiny se slabou pomerančovou vůní. Po užití každého sáčku je **NUTNÉ** vypít **NEJMÉNĚ 1,5 - 2 LITRY** další čiré tekutiny (např. minerálka, voda, čaj), nevhodné je pít mléko, džus s dužinou, kávu či alkohol! Doporučený režim dodržte, i když Vám večer z konečníku odchází již čirá tekutina, ranní část přípravy by neměla být vynechána a roztok je vhodné dopít!

1) koloskopie v 8:00: 1. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít den před vyšetřením ve 20:00 – 22:00, 2. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít v den vyšetření ve 3:00 – 5:00

2) koloskopie v 9:00: 1. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít den před vyšetřením ve 20:00 – 22:00, 2. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít v den vyšetření ve 4:00 – 6:00

3) koloskopie v 10:00: 1. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít den před vyšetřením ve 21:00 – 23:00, 2. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít v den vyšetření v 5:00 – 7:00

4) koloskopie v 11:00: 1. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít den před vyšetřením ve 21:00 – 23:00, 2. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít v den vyšetření v 6:00 – 8:00

5) koloskopie v odpoledních hodinách od 13:00: 1. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít den před vyšetřením ve 22:00 – 24:00, 2. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít v den vyšetření v 7:00 – 9:00



Ředění a načasování vypití vyprazdňovacího roztoku CITRAFLEET dle termínu vyšetření.

Balení přípravku CitraFleet obsahuje 2 sáčky s práškem. Obsah jednoho sáčku rozpustíte ve sklenici vody (cca 150 ml). Míchejte 2 až 3 minuty až do vzniku bílé, zakalené tekutiny se slabou citrónovou vůní. Po užití každého sáčku je **NUTNÉ** vypít **NEJMÉNĚ 1,5 - 2 LITRY** další čiré tekutiny (např. minerálka, voda, čaj), nevhodné je pít mléko, džus s dužinou, kávu či alkohol! Doporučený režim dodržte, i když Vám večer z konečníku odchází již čirá tekutina, ranní část přípravy by neměla být vynechána a roztok je vhodné dopít!

1) koloskopie v 8:00: 1. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít den před vyšetřením ve 20:00 – 22:00, 2. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít v den vyšetření ve 3:00 – 5:00

2) koloskopie v 9:00: 1. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít den před vyšetřením ve 20:00 – 22:00, 2. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít v den vyšetření ve 4:00 – 6:00

3) koloskopie v 10:00: 1. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít den před vyšetřením ve 21:00 – 23:00, 2. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít v den vyšetření v 5:00 – 7:00

4) koloskopie v 11:00: 1. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít den před vyšetřením ve 21:00 – 23:00, 2. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít v den vyšetření v 6:00 – 8:00

5) koloskopie v odpoledních hodinách od 13:00: 1. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít den před vyšetřením ve 22:00 – 24:00, 2. dávku (150 ml roztoku, poté 2 l vody) vypít v den vyšetření v 7:00 – 9:00